

PESGUARD ALPHA® - 5FL

%5 Esfenvalarate

**Aktif maddesi
Esfenvalarate
Avrupa Birliği'nde
"Sumitomo"
tarafından
desteklenmektedir.**



Kokusuzdur, uygulama sırası ve sonrasında kötü kokuya neden olmaz.

Açığa çıkarıcı, düşürücü ve öldürücü etkileri **"aynı anda"** bünyesinde taşır.

Gün ışığına dayanıklılığı özellikle geliştirilmiştir, kalıcılığı 3 ayın üzerindedir.

Kendisine karşı gelişmiş bir direnç mevcut değildir.

1 lt ile, spreyleme yöntemiyle **4.000 m²** alanda rezidüel karasinek mücadelesi yapılabilir.

1 lt ile, sepreyleme yöntemiyle, **2000 m²** alanda rezidüel hamamböceği mücadelesi yapılabilir.

Kontakt yolu (*temas yolu ile*) etkilidir.

AÇIK ALAN ULV

ZARARLI TÜRÜ YAŞAM EVRESİ	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA DOZU	SEYRELTME ORANI	UYGULAMA ARALIĞI
KARASİNEK ERGİN	1 litre/ha	2 g a.i/ha	1 litre ilaç + 24 litre su	-

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

KAPALI ALAN REZİDÜEL

ZARARLI TÜRÜ YAŞAM EVRESİ	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA DOZU	SEYRELTME ORANI	UYGULAMA ARALIĞI
HAMAMBÖCEĞİ ERGİN	100 ml/m ²	50 mg a.i/m ²	1 litre ilaç + 99 litre su	90 GÜN
KARASİNEK ERGİN	100 ml/m ²	25 mg a.i/m ²	1 litre ilaç + 99 litre su	95 GÜN
SİVRİSİNEK ERGİN	100 ml/m ²	12,5 mg a.i/m ²	1 litre ilaç + 199 litre su	98 GÜN



 **Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş.**

Maslak Mah. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No. 1 Kat 18 34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0(212) 290 25 60 (pbx) Fax: 0(212) 290 25 75-76

PESGUARD ALPHA® - 5FL

%5 Esfenvalarate

**Aktif maddesi
Esfenvalarate
Avrupa Birliği'nde
“Sumitomo”
tarafından
desteklenmektedir.**



Kokusuzdur, uygulama sırası ve sonrasında kötü kokuya neden olmaz.

Açığa çıkarıcı, düşürücü ve öldürücü etkileri **“aynı anda”** bünyesinde taşır.

Gün ışığına dayanıklılığı özellikle geliştirilmiştir, kalıcılığı 3 ayın üzerindedir.

Kendisine karşı gelişmiş bir direnç mevcut değildir.

1 lt ile, spreyleme yöntemiyle **4.000 m²** alanda rezidüel karasinek mücadelesi yapılabilir.

1 lt ile, sepreyleme yöntemiyle, **2000 m²** alanda rezidüel hamamböceği mücadelesi yapılabilir.

Kontak yol (*temas yolu ile*) etkilidir.

AÇIK ALAN ULV

ZARARLI TÜRÜ YAŞAM EVRESİ	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA DOZU	SEYRELTME ORANI	UYGULAMA ARALIĞI
KARASİNEK ERGİN	1 litre/ha	2 g a.i/ha	1 litre ilaç + 24 litre su	-

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

KAPALI ALAN REZİDÜEL

ZARARLI TÜRÜ YAŞAM EVRESİ	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA DOZU	SEYRELTME ORANI	UYGULAMA ARALIĞI
HAMAMBÖCEĞİ ERGİN	100 ml/m ²	50 mg a.i/m ²	1 litre ilaç + 99 litre su	90 GÜN
KARASİNEK ERGİN	100 ml/m ²	25 mg a.i/m ²	1 litre ilaç + 99 litre su	95 GÜN
SİVRİSİNEK ERGİN	100 ml/m ²	12,5 mg a.i/m ²	1 litre ilaç + 199 litre su	98 GÜN



 **Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş.**

Maslak Mah. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No. 1 Kat 18 34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0(212) 290 25 60 (pbx) Fax: 0(212) 290 25 75-76