

SUMILARV® 5 WDG

%5 Pyriproxyfen

**Aktif maddesi
Pyriproxyfen
Avrupa Birliği'nde
“Sumitomo”
tarafından
ruhsatlandırılmıştır.**

SUDA DAĞILAN GRANÜL FORMÜLASYON JHM



LD₅₀ Aktif Madde (Pyriproxyfen): > 5000 mg / kg

KULLANMA ŞEKLİ:

Suda dağılan granül (WDG) formunda üretilen bu özel formülasyon, sırt pulverizatörleri, motorlu atomizerler veya mistbloverlar ile jir alanlarına püskürtülerek rahatlıkla kullanılabilir.

UYGULAMA ORANLARI




SİVRİSİNEK LARVA ÜREME ALANLARI

HEDEF BÖCEK	UYGULAMA ALANI	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU	SULANDIRMA ORANI	ETKİNLİK/ GÜN
SİVRİSİNEK LARVALARI	TEMİZ SU	SUDA ERİTİLEREK SPREYLEME	10 g a.i./ha	10 gr ürün 10 litre su ile sulandırılır 500 m ² sucul alana uygulanır.	27 GÜN



KARASİNEK LARVA ÜREME ALANLARI

HEDEF BÖCEK	UYGULAMA ALANI	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU	SULANDIRMA ORANI
KARASİNEK LARVALARI	ÇÖPLÜK, GÜBRELIK VE AHIRLARDA	SUDA ERİTİLEREK SPREYLEME	0,05 g a.i./m ²	200 gr ürün 10 lt su ile sulandırılır 200 m ² alana uygulanır. (50 ml/m ² uygulama)



 **Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş.**

Maslak Mah. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No. 1 Kat 18 34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0(212) 290 25 60 (pbx) Fax: 0(212) 290 25 75-76